

Tutorium Mathematik I M WM

15.12.2006

Lösungen

1. Man diskutiere die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x = 0 \\ \operatorname{arccot}\left(x + \frac{1}{x^2}\right) & \text{für } x \neq 0 \end{cases}$$

(d.h. Definitionsbereich in \mathbb{R} , Nullstellen, Extrema, Monotonieverhalten, Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$, Skizze.)

Lösung:

(a) Definitionsbereich: Die Funktion $f(x) = \operatorname{arccot}\left(x + \frac{1}{x^2}\right)$ ist für alle $x \neq 0$ definiert, für die Stelle $x = 0$ ist die Funktion $f(x)$ durch $f(0) := 0$ aber separat definiert, also ist f für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert, d.h. $D(f) = \mathbb{R}$.

(b) Nullstellen: Wegen $f(0) = 0$ liegt für $x = 0$ eine Nullstelle vor. Da die Funktion arccot keine Nullstellen besitzt, gibt es keine weiteren Nullstellen für f .

(c) Lokale Extrema: Wir berechnen zunächst f' und f'' :
Für $x \neq 0$ gilt

$$f' = -\frac{1}{1 + \left(x + \frac{1}{x^2}\right)^2} \left(1 - \frac{2}{x^3}\right).$$

Auf gemeinsamen Nenner gebracht und gekürzt ergibt sich für $x \neq 0$:

$$f'(x) = -\frac{x^4 - 2x}{x^6 + x^4 + 2x^3 + 1}.$$

Daraus ergibt sich für f'' ($x \neq 0$) durch Anwenden der Quotientenregel

$$f''(x) = -\frac{(4x^3 - 2)(x^6 + x^4 + 2x^3 + 1) - (x^4 - 2x)(6x^5 + 4x^3 + 6x^2)}{(x^6 + x^4 + 2x^3 + 1)^2}.$$

(Da mit f'' später nicht mehr weitergerechnet wird, verzichten wir hier auf weitere Vereinfachung.)

Als Kandidaten für lokale Extrema kommen alle Punkte x^* in Frage, für die entweder $f'(x^*) = 0$ gilt oder die Rand des Definitionsbereiches sind (bzw. die separat definiert sind). Wir untersuchen also zunächst $f'(x) = 0$. Daraus folgt $x^4 - 2x = x(x^3 - 2) = 0$. Diese Gleichung besitzt im Reellen die Lösungen $x_1 = 0$ und $x_2 = \sqrt[3]{2}$. Der obige Ausdruck ist aber nur für $x \neq 0$ gültig, also ist hier nur $x_2 = \sqrt[3]{2}$ zu untersuchen ($x = 0$ muss später als "separat" definierter Punkt sowieso noch getrennt untersucht werden.) Um festzustellen, ob x_2 ein lokales Extremum darstellt, müssen wir $f''(x_2)$ berechnen.

Es gilt $f''(x_2) < 0$, also liegt an der Stelle $(x_2, f(x_2)) \approx (1.25, 0.48)$ ein lokales Maximum vor. Beachten Sie, dass es sich dabei nur um ein lokales Maximum handelt. Bei der Untersuchung des Verhaltens von $f(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ wird sich herausstellen, dass $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pi$, d.h. $f(x)$ strebt gegen einen Wert, der größer als $f(x_2)$ ist. Somit ist x_2 nur ein lokales Maximum. Es gibt kein globales Maximum.

Nun muss noch die Stelle $x = 0$ untersucht werden (da die obige Formel für f' ja nicht für $x = 0$ galt und somit an dieser Stelle auch ein Extremum vorliegen könnte): Da $\operatorname{arccot} y > 0$ ist für alle $y \in \mathbb{R}$, liegt an der Stelle $x = 0$ sogar ein *globales* Minimum der Funktion f vor (es gilt ja $0 = f(0) < f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$).

- (d) Monotonieverhalten: Da der Nenner von $f'(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ positiv ist ($x^6 + x^4 + 2x^3 + 1 = (x^6 + 2x^3 + 1) + x^4 = (x^3 + 1)^2 + x^4$), hängt das Vorzeichen von $f'(x)$ nur von dessen Zähler ab. Es gilt:

(i) $x^4 - 2x = x(x^3 - 2) > 0$, falls $x < 0$ und $x < +\sqrt[3]{2}$ ist bzw. falls $x > 0$ und $x > \sqrt[3]{2}$ und

(ii) $x^4 - 2x = x(x^3 - 2) < 0$, falls $x > 0$ und $x < +\sqrt[3]{2}$.

Somit ergibt sich (man beachte das Minus vor dem Quotienten von f'):

- f ist monoton fallend für $x < 0$ und $x > \sqrt[3]{2}$
- f ist monoton wachsend für $0 < x < \sqrt[3]{2}$.

- (e) Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$: Da arccot eine stetige Funktion ist, können Funktionsauswertung und Limesbildung vertauscht werden und es ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arccot} \left(x + \frac{1}{x^2} \right) = \operatorname{arccot} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + \frac{1}{x^2} \right).$$

Da $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + \frac{1}{x^2} \right) = \infty$ und $\lim_{y \rightarrow \infty} \operatorname{arccot} y = 0$ folgt somit

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

Analog ergibt sich wegen $\lim_{y \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} y = \pi$ für $x \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} \left(x + \frac{1}{x^2} \right) = \pi.$$

2. Man diskutiere die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} + |x + 1|$$

und bestimme dabei Definitionsbereich, Nullstellen, Monotonie, Extremwerte, Wendepunkte und Asymptoten. Weiters fertige man eine Skizze an.

Lösung:

- (a) Definitionsbereich: An der Stelle $x = 1$ besitzt $f(x)$ eine Polstelle, sonst ist $f(x)$ auf ganz \mathbb{R} definiert und somit erhalten wir $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- (b) Nullstellen: Im weiteren lösen wir den Betrag auf und unterscheiden folgende zwei Fälle:
- (i) $x < -1$: $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} - x - 1$

(ii) $x > -1$: $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1} + x + 1$

In allen weiteren Betrachtungen werden die obigen zwei Fälle getrennt untersucht.

- (i) $\frac{x^2+1}{x-1} - x - 1 = 0$. Dies ist gleichbedeutend mit $x^2 + 1 = (x + 1)(x - 1)$ bzw. $x^2 - 1 = x^2 + 1$, und dies liefert $-1 = 1$, also gibt es keine Nullstelle.
- (ii) $\frac{x^2+1}{x-1} + x + 1 = 0$. Dies führt zu $x^2 + 1 = -(x + 1)(x - 1)$, weiter zu $x^2 + 1 = -x^2 + 1$, und somit erhalten wir die doppelte Nullstelle $x_{1,2} = 0$, also $N_1(0, 0) = N_2(0, 0)$.

(c) Monotonie, Extremwerte und Wendepunkte:

- (i) Zunächst formen wir $f(x)$ etwas um:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} - x - 1 = \frac{x^2 + 1 - x^2 - x + x + 1}{x - 1} = \frac{2}{x - 1}$$

Abgeleitet erhalten wir

$$f'(x) = -\frac{2}{(x - 1)^2}$$
$$f''(x) = \frac{4}{(x - 1)^3}$$

Da $f'(x) \leq 0$ für alle $x \in (-\infty, -1)$ gilt, folgt daraus, dass $f(x)$ auf $(-\infty, -1)$ monoton fallend ist.

Setzen wir $f'(x) = 0$, so ergibt sich $0 = 2$, was ein Widerspruch ist, also gibt es keine Extremwerte.

Analog führt $f''(x) = 0$ zu $4 = 0$, also haben wir auch keinen Wendepunkt für $x < -1$.

- (ii) Zunächst formen wir $f(x)$ wieder um:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} + x + 1 = \frac{x^2 + 1 + x^2 - 1}{x - 1} = \frac{2x^2}{x - 1}$$

Abgeleitet erhalten wir

$$f'(x) = \frac{4x(x - 1) - 2x^2}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 4x}{(x - 1)^2}$$
$$f''(x) = \frac{(4x - 4)(x - 1)^2 - 2(x - 1)(2x^2 - 4x)}{(x - 1)^4} = \frac{4}{(x - 1)^3}$$

Um die Monotonie zu bestimmen, suchen wir nach $x \in (-1, \infty)$, sodass $f'(x) \geq 0$ (monoton steigend) bzw. $f'(x) \leq 0$ (monoton fallend) gilt. Bestimmen wir zuerst die Nullstellen von $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow 2x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ oder } x = 2$$

Somit ist $f'(x) > 0$ für $x > 2$ oder $x < 0$ und $f'(x) < 0$ für $0 < x < 2$. Da wir uns nur im Intervall $(-1, \infty)$ aufhalten, folgt daraus: f ist streng monoton fallend für $x \in (0, 2)$ und streng monoton steigend für $x \in (-1, 0) \cup (2, \infty)$.

Fassen wir somit das Monotonieverhalten zusammen: f ist streng monoton fallend im Intervall $(-\infty, -1)$, streng monoton steigend in $(-1, 0)$, dann streng monoton fallend in $(0, 2)$ und schließlich wieder streng monoton steigend in $(2, \infty)$.

Nun wollen wir noch die Extremwerte berechnen. Dazu setzen wir $f'(x) = 0$. Das haben wir bereits oben gemacht. Es ergeben sich $x_1 = 0$ und $x_2 = 2$ als x -Werte für die Extremstellen. Der kritische Punkt $x_1 = 0$ ist ein lokales Maximum weil $f''(x) < 0$ und der kritische Punkt $x_2 = 2$ ist ein lokales Minimum weil $f''(2) > 0$. Wie in Punkt (i) gibt es auch hier keinen Wendepunkt (da $f''(x) \neq 0$ für alle $x \in (-1, \infty)$ gilt).

(d) Asymptoten:

(i) Für $x \rightarrow -\infty$ hat $f(x) = \frac{2}{x-1}$ die Asymptote $y = 0$.

(ii) Bei der Polstelle haben wir die Asymptote $x = 1$. Nun berechnen wir jene für $x \rightarrow \infty$:

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x-1} = 2$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - \alpha x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2}{x-1} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x-1} = 2$$

Somit erhalten wir die Asymptote: $y = \alpha x + \beta = 2x + 2$.