Tutorium Mathematik II M WM

1.6.2007

Lösungen

Lösen Sie folgende Anfangswertprobleme:

1. $y' = \frac{x+y+1}{2x+2y+1}$, $y(1) = -\frac{4}{3}$.

Lösung:

Es handelt sich um eine Differentialgleichung der Form $y' = f\left(\frac{ax+by+c}{\alpha x+\beta y+\gamma}\right)$. Da $ax + by = \lambda(\alpha x + \beta y)$ gilt, d.h.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

verwenden wir die Substitution $z(x) = x + y(x) + 1$ (d.h. der Zähler wird durch z ersetzt - der Nenner wäre ebenso möglich). Daraus ergibt sich $z' = 1 + y'$ bzw. $y' = z' - 1$ und in die Differentialgleichung eingesetzt, erhält man

$$z' - 1 = \frac{z}{2z-1} \quad \text{bzw.} \quad z' = \frac{3z-1}{2z-1}.$$

Diese Differentialgleichung lässt sich durch Trennung der Veränderlichen lösen.

$$\int \frac{2z-1}{3z-1} dz = \int dx$$

Der Integrand links ist eine rationale Funktion, für die zuerst eine Polynomdivision durchgeführt wird:

$$(2z-1) : (3z-1) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \frac{1}{3z-1} = \frac{2}{3} - \frac{1}{9z-3}.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} \int \frac{2z-1}{3z-1} dz &= \int \frac{2}{3} - \frac{1}{9z-3} dz \\ &= \frac{2}{3}z - \ln(9z-3) \frac{1}{9} + C_1 \end{aligned}$$

$$\int dx = \int 1 dx = x + C_2$$

Somit erhält man als Lösung

$$\frac{2}{3}z - \frac{1}{9} \ln(3z-1) = x + C_3$$

bzw. rückeringesetzt

$$\frac{2}{3}(x+y+1) - \frac{1}{9} \ln(3(x+y+1)-1) = x + C_3.$$

Einige Vereinfachungen führen schliesslich auf

$$6y - \ln(3x + 3y + 2) = 3x + C.$$

Nun wollen wir noch den Wert der Konstante C wissen. Wir setzen daher den Anfangswert ein:

$$6 \left(-\frac{4}{3} \right) - \ln(3 - 4 + 2) = 3 + C \quad \Leftrightarrow \quad C = -11.$$

Damit erhalten wir als Lösung:

$$6y - \ln(3x + 3y + 2) = 3x - 11.$$

2. $y' = \frac{2x-y+3}{x-y+2}$, $y(0) = 1$.

Lösung:

Auch das ist eine Differentialgleichung der Form $y' = f\left(\frac{ax+by+c}{\alpha x+\beta y+\gamma}\right)$ aber es gibt kein λ mit $ax+by = \lambda(\alpha x+\beta y)$. Ziel ist es vorerst, die Konstanten c und γ zu eliminieren, um anschliessend die Transformation $\frac{y}{x}$ anzuwenden. Also lösen wir zuerst das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 2x - y &= -3 \\ x - y &= -2 \end{aligned}$$

und erhalten $(x_0, y_0) = (-1, 1)$. Daher verwendet man die Substitution $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (x - x_0, y - y_0) = (x + 1, y - 1)$. Für die neuen Variablen lautet die Differentialgleichung

$$\tilde{y}' = \frac{2\tilde{x} - \tilde{y}}{\tilde{x} - \tilde{y}}.$$

Nun wird auf der rechten Seite durch x dividiert

$$\tilde{y}' = \frac{2 - \frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}}{1 - \frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}}.$$

und wie folgt substituiert $z = \frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}$ also $\tilde{x}z = \tilde{y}$. Beidseitiges Differenzieren ergibt $z + \tilde{x}z' = y'$ (Achtung: Kettenregel).

Die Differentialgleichung lautet dann

$$z + \tilde{x}z' = \frac{2 - z}{1 - z}$$

und daher

$$\tilde{x}z' = \frac{2 - z}{1 - z} - z = \frac{z^2 - 2z + 2}{1 - z}.$$

Diese Differentialgleichung kann man durch Trennung der Veränderlichen lösen:

$$\int \frac{1 - z}{z^2 - 2z + 2} dz = \int \frac{1}{\tilde{x}} dx.$$

Es gilt

$$\begin{aligned}\int \frac{1-z}{z^2-2z+2} dz &= -\frac{1}{2} \int \frac{2z-2}{z^2-2z+2} dz \\ &= -\frac{1}{2} \ln(z^2-2z+2) + C_1 \\ &= \ln\left(\frac{1}{\sqrt{z^2-2z+2}}\right) + C_1\end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{\tilde{x}} dx = \ln(\tilde{x}) + C_2$$

Also erhält man

$$\ln\left(\frac{1}{\sqrt{z^2-2z+2}}\right) = \ln(\tilde{x}) + C_3$$

bzw.

$$\frac{1}{\sqrt{z^2-2z+2}} = C_4 \tilde{x}.$$

Das soll nach z aufgelöst werden:

$$1 = C\tilde{x}^2(z^2-2z+2) \quad \Leftrightarrow \quad z^2-2z + \left(2 - \frac{1}{C\tilde{x}^2}\right) = 0$$

und nun liegt eine quadratische Gleichung vor, wonach folgt

$$z_1 = 1 + \sqrt{\frac{1}{C\tilde{x}^2} - 1}, \quad z_2 = 1 - \sqrt{\frac{1}{C\tilde{x}^2} - 1}.$$

Nun wird rücksubstituiert mit $z = \frac{\tilde{y}}{\tilde{x}} = \frac{y-1}{x+1}$. Wir erhalten die zwei Lösungsgruppen

$$\frac{y-1}{x+1} = 1 + \sqrt{\frac{1}{C(x+1)^2} - 1}, \quad \frac{y-1}{x+1} = 1 - \sqrt{\frac{1}{C(x+1)^2} - 1}.$$

Setzt man nun den Anfangswert ein, so bekommt man für die erste Lösungsgruppe

$$0 = 1 + \sqrt{\frac{1}{C} - 1}.$$

Dafür gibt es aber keine reelle Lösung. Also muss die gesuchte Lösung der zweiten Lösungsgruppe angehören:

$$0 = 1 - \sqrt{\frac{1}{C} - 1} \quad \Leftrightarrow \quad C = \frac{1}{2}.$$

Und nun lautet die Lösung des Anfangswertproblems

$$\frac{y-1}{x+1} = 1 - \sqrt{\frac{2}{(x+1)^2} - 1}$$

was sich noch wie folgt vereinfachen lässt

$$y = x + 2 - \sqrt{-x^2 - 2x + 3}.$$